

Сбор

Фумигация

Яйцесклад

Транспортировка

Гигиена



Наиболее высокий риск загрязнения яйца – в первые три минуты после снесения.

Поддерживайте чистоту в гнездах:

- ежедневно убирайте грязную подстилку и помет;
- еженедельно мойте и дезинфицируйте ленту яйцесбора.



Отдельно собирайте и храните чистое и грязное напольное яйцо.

Проводите фумигацию формалином не позднее 2 часов после сбора яйца:

- Нагрейте 10 г гранул параформальдегида или 43 мл формалина (37,5%) и 21 г перманганата калия на 1 м³ помещения;
- Минимальная температура – 24С, относительная влажность – 65%;
- Включите разгонные вентиляторы для равномерного смешивания воздуха;
- Соблюдайте требования местного законодательства



Храните яйца в сухом месте. Убедитесь в том, что кондиционер и увлажнитель воздуха установлены должным образом и не засорены во избежание протекания воды и прямого попадания воздуха на яйцо.



Не допускайте образования конденсата: обеспечьте оптимальную температуру при транспортировке яйца.



Мойте и дезинфицируйте яйцесклад после вывоза яйца.




Перед погрузкой яйца убедитесь, что транспортное средство тщательно вымыто и продезинфицировано.

Работа с яйцом

Собирайте яйца минимум четыре раза в день.




При фумигации яиц используйте пластиковые лотки.




Мытье и дезинфекция яйцесклада после вывоза яиц

Возраст яиц	Температура хранения	Относит. влажность
0-7 дней	18 °С	75 - 80%
8-13 дней	12-15 °С	
> 13 дней	12 °С	

Перед укладкой яйца в коробки или ящики охлаждайте его до температуры ниже физиологического нуля (24С).



Загружайте тележку снизу вверх.



Соблюдайте осторожность при погрузке яйца во избежание его повреждения.

